

**Contiens Acétaminophen et other ingredients  
Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients**

**30**  
Tablets  
Comprimés

**DIN 02154234**

**ACETAMINOPHEN, CAFFEINE  
AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS  
COMPRIMÉS D'ACÉTAMINOPHÈNE,  
DE CAFFÉINE ET DE PHOSPHATE DE CODÉINE**

**ADULT TABLETS / COMPRIMÉS POUR ADULTES**

Reduces fever and temporarily relieves mild to moderate pain  
Réduit la fièvre et soulage temporairement  
les douleurs légères à modérées

"This preparation contains codeine and should not  
be administered to children except on the advice of  
a physician, dentist or nurse practitioner."

"Cette préparation contient de la codéine et ne devrait pas  
être administrée aux enfants sauf sur la recommandation  
d'un médecin, d'un dentiste ou d'un infirmier praticien."

**RIVA**

**Laboratoire RIVA Inc.**  
Blainville (Québec) J7C 3V4  
www.labriva.com

**Drug Facts / Info-médicament**

**Active ingredients (in each tablet)**  
**Acétaminophène 300 mg** ..... Pain reliever, fever reducer  
Caffeine 15 mg ..... Stimulant  
Codeine phosphate 8 mg ..... Pain reliever  
**Utilités**  
**Acétaminophène 300 mg** ..... Analgésique, antipyrétique  
Caféine 15 mg ..... Stimulant  
Phosphate de codéine 8 mg ..... Analgésique

**Warnings** **Liver warning:** Acetaminophen may cause **severe or possibly fatal liver damage** if you take ... with other drugs containing acetaminophen ... while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include ... **yellow skin or eyes** ... **dark urine** ... **sweating** ... **nausea** ... **vomiting** ... **stomach pain** ... **unusual tiredness** ... **loss of appetite**.

**Allergy alert:** Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include ... **skin reddening** ... **blisters** ... **rash**. If any of the above noted symptoms occur, **stop use and seek medical help right away.**

**Do not use** ... in children under 18 years old ... with any other drug containing acetaminophen, caffeine or codeine ... if you ... are allergic to acetaminophen, codeine, or other opioids, or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist.



3200-27001

• are in your last trimester of pregnancy or breastfeeding (codeine may cause serious harm to breastfed baby) • have difficulty breathing, have asthma, chronic lung disease or other chronic breathing problems • have suffered head injury • are at risk of blocked sinuses or constipation • suffer from seizures.

**Ask a doctor or pharmacist before use if you** • have liver or kidney disease • have high blood pressure, glaucoma, or overactive bladder syndrome • take the blood thinning drug warfarin • take other medications that can make you sleepy or less alert (for example: narcotic analgesics, sedating antihistamines), anti-depressants, others prescription drugs 3 or more alcohol drinks every day or have recently had surgery, under general anaesthesia • are pregnant or breastfeeding.

**When using this product** • avoid caffeine containing products. Too much caffeine may cause rapid heart rate, nervousness or sleeplessness • avoid alcoholic drink • do not drive a motor vehicle or operate a machinery.

**Stop use and ask a doctor if** • pain lasts for more than 5 days • fever lasts more than 3 days • you feel sedated or drowsy, confused, have shallow breathing or have severe constipation.

• **Keep out of reach of children.** This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, Call a Poison Control Centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.

**Mises en garde** **Avertissement-Oie:** L'acétaminophène peut causer de **graves dommages au foie, possiblement mortels**, si vous • **dépassez la dose recommandée par période de 24 heures** • **le prenez avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène** • avec 3 consommations alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de dommages au foie peuvent comprendre • jaunissement de la peau ou des yeux • urine foncée • transpiration • nausée • vomissement • maux d'estomac • fatigue inhabituelle • perte d'appétit.

**Alerte aux allergies** L'acétaminophène peut causer des réactions cutanées graves. Les symptômes peuvent comprendre • rougeur de la peau • **cloques** • **urticaire cutanée**. **Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient, cessez l'utilisation du produit et consultez un médecin immédiatement.**

**Ne pas utiliser** • chez les enfants de moins de 18 ans • avec tout autre médicament contenant de l'acétaminophène, de la caféine ou de la codéine • si vous

• êtes allergique à l'acétaminophène, à la codéine, ou à d'autres opioïdes, ou à tout autre ingrédient de ce produit. En cas d'incertitude quant à la présence d'acétaminophène dans un médicament, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. • êtes au dernier trimestre de la grossesse ou si vous allaitez (la codéine peut être très nocive pour un bébé allaité) • avez de la difficulté à respirer, souffrez d'asthme, d'une affection pulmonaire chronique ou d'autres difficultés respiratoires chroniques • avez subi une blessure à la tête • êtes sujet à des blocages intestinaux ou à la constipation • êtes sujet aux convulsions.

**Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous** • souffrez d'une affection du foie ou du rein • souffrez d'hypertension, de glaucome ou du syndrome ou de la vessie hyperactive • prenez de la warfarine, un médicament anticoagulant • prenez d'autres médicaments qui peuvent vous rendre somnolent ou moins alerte (comme les analgésiques narcotiques, les antihistaminiques à effet sédatif, des antidépresseurs, d'autres médicaments sur ordonnance, plus de 3 boissons alcoolisées par jour, ou avez subi récemment une chirurgie sous anesthésie générale • êtes enceinte ou allaitez.

**Lorsque vous utilisez ce produit** • éviter de consommer des produits contenant de la caféine. Un excès de caféine peut accélérer le rythme cardiaque et causer de la nervosité ou de l'insomnie. • éviter de consommer de l'alcool • ne pas conduire un véhicule motorisé ni utiliser des machines. • **Cessez d'utiliser et consultez un médecin si**

la douleur persiste pendant plus de 5 jours • la fièvre persiste pendant plus de 3 jours • vous vous sentez sous sédation ou somnolent, confus, si votre respiration est superficielle ou si vous souffrez de constipation grave.

• **Garder hors de la portée des enfants.** Cet emballage contient une quantité suffisante de médicament pour causer des effets nocifs graves à un enfant. En cas de surdose, appelez un centre antipoison ou obtenez une assistance médicale immédiate. Une attention médicale rapide est primordiale même si vous ne remarquez aucun signe ni symptôme.

**Directions** • Adultes 18 years and older: • take 1 tablet every 4 to 6 hours • if pain or fever does not respond to 1 tablet, take 2 tablets at next dose • do not take more than 12 tablets in 24 hours • do not take more than directed (see liver warning).

**Mode d'emploi** • Adultes de 18 ans et plus: • prendre 1 comprimé toutes les 4 à 6 heures • si la douleur ou la fièvre persistent avec 1 comprimé, prendre 2 comprimés lors de la prochaine dose • ne pas prendre plus de 12 comprimés par période de 24 heures • ne pas dépasser la dose recommandée (voir Avertissement-Oie).

**Other information** • Store between 15 to 30 °C. • Our bottle is sealed for your protection. Do not use if the undercap aluminum foil seal is broken or missing. • Child resistant package.

**Autres renseignements** • Conserver entre 15 et 30 °C. • Notre bouteille est scellée pour votre sécurité. Ne pas utiliser si l'opercule en aluminium sous le bouchon est brisé ou manquant. • Emballage à l'épreuve des enfants.

**Inactive ingredients** Colloidal Silicon Dioxide, Corn Starch, Croscarmellose Sodium, Croscroptone, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Povidone and Stearic Acid.

**Ingrédients inactifs** Acide silicique, amidon de maïs, cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, croscroptovone, dioxyde de silicium colloïdal, povidone et stéarate de magnésium.

**Questions?** 1-800-363-7998

**Contains Acetaminophen and other ingredients  
Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients**

**100** Tablets  
Comprimés

**DIN 02154234**

**ND ACETAMINOPHEN, CAFFEINE  
AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS  
N COMPRIMÉS D'ACÉTAMINOPHÈNE,  
DE CAFFÉINE ET DE PHOSPHATE DE CODÉINE**

**ADULT TABLETS / COMPRIMÉS POUR ADULTES**

Reduces fever and temporarily relieves mild to moderate pain  
Réduit la fièvre et soulage temporairement les douleurs légères à modérées

"This preparation contains codeine and should not be administered to children except on the advice of a physician, dentist or nurse practitioner."  
« Cette préparation contient de la codéine et ne devrait pas être administrée aux enfants sauf sur la recommandation d'un médecin,

aux enfants sauf sur la recommandation d'un médecin,  
d'un dentiste ou d'un infirmier praticien. »

**RIVA** Laboratoire RIVA Inc.  
Blainville (Québec) J7C 3V4  
www.laboriva.com

**Drug Facts / Info-médicament**

**Active ingredients (in each tablet)**  
**Acétaminophène 300 mg** ..... Pain reliever, fever reducer  
Caffeine 15 mg ..... Stimulant  
Codeine phosphate 8 mg ..... Pain reliever  
**Ingredients actifs (dans chaque comprimé)**  
**Acétaminophène 300 mg** ..... Analgésique, antipyrétique  
Caféine 15 mg ..... Stimulant  
Phosphate de codéine 8 mg ..... Analgésique

**Warnings** **Liver warning:** Acetaminophen may cause severe or possibly fatal liver damage if you take more than the recommended dose in 24 hours with other drugs containing acetaminophen while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include yellow skin or eyes, dark urine, sweating, nausea, vomiting, stomach pain, unusual tiredness, loss of appetite.  
**Allergy alert** Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include skin redness, blisters, rash.  
**If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.**



**PULL HERE**

3200-27000

**Do not use** • in children under 18 years old • with any other drug containing acetaminophen, caffeine or codeine • if you are allergic to acetaminophen, codeine, or other opioids, or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. (codeine may cause serious harm to breastfed baby) • have difficulty breathing, have asthma, chronic lung disease or other chronic breathing problems • have suffered head injury • are at risk of blocked intestines or constipation • suffer from seizures.  
**Ask a doctor or pharmacist before use if you** • have liver or kidney disease • have high blood pressure, glaucoma, or overactive bladder syndrome • take the blood thinning drug warfarin • take other medications that can make you sleepy or less alert (for example: narcotic analgesics, sedating antihistamines), anti-depressants, other prescription drugs, 3 or more alcohol drinks every day or have recently had surgery under general anaesthesia • are pregnant or breastfeeding.  
**When using this product** • avoid caffeine containing products. Too much caffeine may cause rapid heart rate, nervousness or sleeplessness • avoid alcoholic drink • do not drive a motor vehicle or operate machinery.  
**Stop use and ask a doctor if** • pain lasts for more than 5 days • fever lasts more than 3 days • you feel sedated or drowsy, confused, have shallow breathing or have severe constipation.  
**Keep out of reach of children.** his package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a Poison Control Centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.  
**Mises en garde** **Avertissement-foie :** L'acétaminophène peut causer de graves dommages au foie, possiblement mortels, si vous • déplacez la dose recommandée par période de 24 heures • le prenez avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène • avec 3 consommations alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de dommages au foie peuvent comprendre • jaunissement de la peau ou des yeux • urine foncée • transpiration • nausée • vomissement • maux d'estomac • fatigue inhabituelle • perte d'appétit.  
**Alerte aux allergies :** L'acétaminophène peut causer des réactions cutanées graves. Les symptômes peuvent comprendre • rougeur de la peau • cloques • éruption cutanées. Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient, cessez l'utilisation du produit et consultez un médecin immédiatement.  
**Ne pas utiliser** • chez les enfants de moins de 18 ans • avec tout autre médicament contenant de l'acétaminophène, de la caféine ou de la codéine • si vous • êtes allergique à l'acétaminophène, à la codéine, ou à d'autres opioïdes, ou à tout autre ingrédient de ce produit. En cas d'incertitude quant à la présence d'acétaminophène dans un médicament, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien.  
• êtes au dernier trimestre de la grossesse ou si vous avez la grossesse peut être très nocive pour un bébé allaité) • avez de la difficulté à respirer, souffrir d'asthme, d'une affection pulmonaire chronique ou d'autres difficultés respiratoires chroniques • avez subi une blessure à la tête • êtes sujet à des blocages intestinaux ou à la constipation • êtes sujet aux convulsions. ▶

**Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous** • souffrez d'une affection du foie ou du rein • souffrez d'hypertension, de glaucome ou du syndrome ou de la vessie hyperactive • prenez de la warfarine, un médicament anticoagulant • prenez d'autres médicaments qui peuvent vous rendre somnolent ou moins alerte (comme les analgésiques narcotiques, les antihistaminiques à effet sédatif), des antidépresseurs, d'autres médicaments sur ordonnance, plus de 3 boissons alcoolisées par jour, ou avez subi récemment une chirurgie sous anesthésie générale • êtes enceinte ou allaité.  
**Lorsque vous utilisez ce produit** • éviter de consommer des produits contenant de la caféine. Un excès de caféine peut accélérer le rythme cardiaque et causer de la nervosité ou de l'insomnie, • éviter de consommer de l'alcool • ne pas conduire un véhicule motorisé ni utiliser des machines.  
**Cessez d'utiliser et consultez un médecin si** • la douleur persiste pendant plus de 5 jours • la fièvre persiste pendant plus de 3 jours • vous vous sentez sous sédation ou somnolent, confus, si votre respiration est superficielle ou si vous souffrez de constipation grave.  
● **Garder hors de la portée des enfants.** Cet emballage contient une quantité suffisante de médicament pour causer des effets nocifs graves à un enfant. En cas de surdose, appelez un centre antipoison ou obtenez une assistance médicale immédiate. Une attention médicale rapide est primordiale même si vous ne remarquez aucun signe ni symptôme.

**Directions** • Adults 18 years and older: • take 1 tablet every 4 to 6 hours • if pain or fever does not respond to 1 tablet, take 2 tablets at next dose. • do not take more than 12 tablets in 24 hours • do not take more than directed (see Liver warning).  
**Mode d'emploi** • Adultes de 18 ans et plus : • prendre 1 comprimé toutes les 4 à 6 heures • si la douleur ou la fièvre persiste avec 1 comprimé, prendre 2 comprimés lors de la prochaine dose • ne pas prendre plus de 12 comprimés par période de 24 heures • ne pas dépasser la dose recommandée (voir Avertissement-foie).

**Other information** • Store between 15 to 30 °C. • Our bottle is sealed for your protection. Do not use if the undercap aluminum foil seal is broken or missing. • Child resistant package.  
**Autres renseignements** • Conserver entre 15 et 30 °C. • Notre bouteille est scellée pour votre sécurité. Ne pas utiliser si l'opercule en aluminium sous le bouchon est brisé ou manquant. • Emballage à l'épreuve des enfants.

**Inactive ingredients** Colloidal Silicon Dioxide, Corn Starch, Croscarmellose Sodium, Crospovidone, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Povidone and Stearic Acid.  
**Ingrédients inactifs** Acide stéarique, amidon de maïs, cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, crospovidone, dioxyde de silicium colloïdal, povidone et stéarate de magnésium.

**Questions?** 1-800-363-7988

Contains Acetaminophen and other ingredients  
Contient de l'acétaminophène et d'autres ingrédients

200  
Tablets  
Comprimés

DIN 02154234

**ACETAMINOPHEN, CAFFEINE  
AND CODEINE PHOSPHATE TABLETS**  
**COMPRIMÉS D'ACÉTAMINOPHÈNE,  
DE CAFÉINE ET DE PHOSPHATE DE CODÉINE**

ADULT TABLETS / COMPRIMÉS POUR ADULTES

Reduces fever and temporarily relieves mild to moderate pain  
Réduit la fièvre et soulage temporairement les douleurs légères à modérées

"This preparation contains codeine and should not be administered to children except on the advice of a physician, dentist or nurse practitioner."  
« Cette préparation contient de la codéine et ne devrait pas être administrée aux enfants sauf sur la recommandation d'un médecin,

d'un dentiste ou d'un infirmier praticien. »

**RIVA**

Laboratoire RIVA Inc.  
Blainville (Québec) J7C 3V4  
www.labriva.com

**Drug Facts / Info-médicament**

**Active ingredients (in each tablet)**  
Acetaminophen 300 mg ..... Pain reliever, fever reducer  
Caffeine 15 mg ..... Stimulant  
Codeine phosphate 8 mg ..... Pain reliever  
Caffeine phosphate 8 mg ..... Pain reliever  
**Ingredients actifs (dans chaque comprimé)**  
Acétaminophène 300 mg ..... Analgésique, antipyrétique  
Caféine 15 mg ..... Stimulant  
Phosphate de codéine 8 mg ..... Analgésique

**Uses** • Reduces fever • Temporarily relieves mild to moderate aches and pain due to • headache • backache • migraine • sore throat • arthritis or rheumatism • pre-menstrual/ menstrual cramps • muscle sprains and strains • toothache • common cold and flu • immunization.

**Usages** • Réduit la fièvre • Soulagement temporaire des douleurs légères à modérées associées • aux maux de tête • aux maux de dos • à la migraine • au mal de gorge • à l'arthrite ou aux rhumatismes • aux crampes menstruelles ou prémenstruelles • aux entorses et aux claquages musculaires • aux maux de dents • au rhume et à la grippe • à la vaccination.

**Warnings** **Liver warning:** Acetaminophen may cause severe or possibly fatal liver damage if you take • more than the recommended dose in 24 hours • with other drugs containing acetaminophen • while drinking 3 or more alcoholic drinks every day. Symptoms of liver damage may include • yellow skin or eyes • dark urine • sweating • nausea • vomiting • stomach pain • unusual tiredness • loss of appetite. ▶



3200-27002

**Allergy alert** Acetaminophen may cause serious skin reactions. Symptoms may include • skin reddening • blisters • rash. If any of the above noted symptoms occur, stop use and seek medical help right away.

**Do not use** • in children under 18 years old • with any other drug containing acetaminophen, caffeine or codeine • if you are allergic to acetaminophen, codeine, or other opioids, or any other ingredient in this product. If you are not sure whether a drug contains acetaminophen, ask a doctor or pharmacist. • are in your last trimester of pregnancy or breastfeeding (codeine may cause serious harm to breastfed baby) • have difficulty breathing, have asthma, chronic lung disease or other chronic breathing problems • have suffered head injury • are at risk of blocked intestines or constipation • suffer from seizures.

**Ask a doctor or pharmacist before use if you** • have liver or kidney disease • have high blood pressure, glaucoma, or overactive bladder syndrome • take the blood thinning drug warfarin • take other medications that can make you sleepy or less alert (for example, narcotic analgesics, sedating antihistamines), anti-depressants, others prescription drugs, 3 or more alcohol drinks every day or have recently had surgery under general anaesthesia • are pregnant or breastfeeding.

**When using this product** • avoid caffeine containing products. Too much caffeine may cause rapid heart rate, nervousness or sleeplessness • avoid alcoholic drink • do not drive a motor vehicle or operate machinery.

**Stop use and ask a doctor if** • pain lasts for more than 5 days • fever lasts more than 3 days • you feel sedated or drowsy, confused, have shallow breathing or have severe constipation.

• **Keep out of reach of children.** This package contains enough drug to seriously harm a child. In case of overdose, call a Poison Control Centre or get medical help right away. Quick medical attention is critical even if you do not notice any signs or symptoms.

**Mises en garde** **Avertissement-tôpe:** L'acétaminophène peut causer de graves dommages au foie, possiblement mortels, si vous • dépassez la dose recommandée par période de 24 heures • le prenez avec d'autres médicaments contenant de l'acétaminophène • avec 3 consommations alcoolisées ou plus par jour. Les symptômes de dommages au foie peuvent comprendre • jaunissement de la peau ou des yeux • urine foncée • transpiration • nausée • vomissement • maux d'estomac • fatigue inhabituelle • perte d'appétit.

**Alerte aux allergies** L'acétaminophène peut causer des réactions cutanées graves. Les symptômes peuvent comprendre • rougeur de la peau • cloques • éruption cutanée. Si l'un des symptômes énumérés ci-dessus survient, cessez l'utilisation du produit et consultez un médecin immédiatement.

**Ne pas utiliser** • chez les enfants de moins de 18 ans • avec tout autre médicament contenant de l'acétaminophène, de la caféine ou de la codéine • si vous • êtes allergique à l'acétaminophène, à la codéine, ou à d'autres opioïdes, ou à tout autre ingrédient de ce produit. En cas d'incertitude quant à la présence d'acétaminophène dans un médicament, renseignez-vous auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. • êtes au dernier trimestre de la grossesse ou si vous allaitez (la codéine peut être très nocive pour un bébé allaité) • avez de la difficulté à respirer, souffrez d'asthme, d'une affection pulmonaire chronique ou d'autres difficultés respiratoires chroniques • avez subi une blessure à la tête • êtes sujet à des blocages intestinaux ou à la constipation • êtes sujet aux convulsions. ▶

**Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous** • souffrez d'une affection du foie ou du rein • souffrez d'hypertension, de glaucome ou du syndrome ou de la vessie antécédente • prenez de la warfarine, un médicament rendant somnolent ou moins alerte (comme les analgésiques narcotiques, les antihistaminiques à effet sédatif), des antidépresseurs, d'autres médicaments sur ordonnance, plus de 3 boissons alcoolisées par jour, ou avez subi récemment une chirurgie sous anesthésie générale • êtes enceinte ou allaitez.

**Lorsque vous utilisez ce produit** • évitez de consommer des produits contenant de la caféine. Un excès de caféine peut accélérer le rythme cardiaque et causer de la nervosité ou de l'insomnie. • évitez de consommer de l'alcool • ne pas conduire un véhicule motorisé ni utiliser des machines.

**Cessez d'utiliser et consultez un médecin si** • la douleur persiste pendant plus de 5 jours • la fièvre persiste pendant plus de 3 jours • vous vous sentez sous sédation ou somnolent, confus, si votre respiration est superficielle ou si vous souffrez de constipation grave.

• **Garder hors de la portée des enfants.** Cet emballage contient une quantité suffisante de médicament pour causer des effets nocifs graves à un enfant. En cas de surdose, appelez un centre antipoison ou obtenez une assistance médicale immédiate. Une attention médicale rapide est primordiale même si vous ne remarquez aucun signe ni symptôme.

**Directions** • Adults 18 years and older: • take 1 tablet every 4 to 6 hours • if pain or fever does not respond to 1 tablet, take 2 tablets at next dose • do not take more than 12 tablets in 24 hours • do not take more than directed (see Liver warning).

**Mode d'emploi** • Adultes de 18 ans et plus: • prendre 1 comprimé toutes les 4 à 6 heures • si la douleur ou la fièvre persiste avec 1 comprimé, prendre 2 comprimés lors de la prochaine dose • ne pas prendre plus de 12 comprimés par période de 24 heures • ne pas dépasser la dose recommandée (voir Avertissement-tôpe).

**Other information** • Store between 15 to 30 °C. • Our bottle is sealed for your protection. Do not use if the undercap aluminum foil seal is broken or missing. • Child resistant packaging.

**Autres renseignements** • Conserver entre 15 et 30 °C. • Notre bouteille est scellée pour votre sécurité. Ne pas utiliser si l'opercule en aluminium sous le bouchon est brisé ou manquant. • Emballage à l'épreuve des enfants.

**Inactive ingredients** Colloidal Silicon Dioxide, Corn Starch, Croscarmellose Sodium, Crospovidone, Magnesium Stearate, Microcrystalline Cellulose, Povidone and Stearic Acid.

**Ingredients inactifs** Acide stéarique, amidon de maïs, cellulose microcristalline, croscarmellose de sodium, crospovidone, dioxyde de silicium colloïdal, povidone et stéarate de magnésium.

**Questions?** 1-800-363-7988